

УДК 547.631.6.831+579.864

**Л. В. Грищук<sup>1,2</sup>, Е. І. Іванов, Г. М. Турянська<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України,  
відділ каталізу,  
Люстдорфська дорога, 86, Одеса, 65080, Україна.<sup>2</sup>Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,  
кафедра фармацевтичної хімії,  
вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026, Україна.

## СИНТЕЗ НОВИХ 6-R-1,2-ДИГІДРОХІНОЛІН-2-ОНІВ

Реакція гетероциклізації 2-хлороацетиламінобензофенонів, як з електроноакцепторними так і електронодонорними замісниками у 5 положенні, з нітритом натрію в середовищі ДМФА або ДМСО приводить до нових 6-заміщених 3-нітро-4-феніл 1,2-дигідрохінолін-2-онів, потенційних біологічно активних сполук.

**Ключові слова:** хлороацетиламінобензофенон, 1,2-дигідрохінолін-2-он, метилхінолін-2-он, трифторметоксихинолін-2-он, 6-трифторметил-сульфанілхінолін-2-он

Хіноліни виявляють широкий спектр біологічної активності. На їх основі створені й уведені в клінічну практику багато відомих препаратів седативної, протипухлинної, протигрибкової, антибактеріальної і ін. дії. Винятково висока антибактеріальна активність, широкий спектр дії і відсутність придбаної резистентності до мікроорганізмів у результаті введення атома фтору у молекулу хінолону дозволили створити високоефективні синтетичні антибіотики ряду фторхінолону – норфлоксацин, пефлоксацин, ломефлоксацин, цiproфлоксацин, тосуфлоксацин і ін. [1–3].


Раніше [4, 5] ми повідомляли про синтез похідних 1,2-дигідрохінолін-2-ону взаємодією ацилованих бензофенонів з деякими ациклічними та аліциклічними амінами та роданідом калію у середовищі ДМСО або ДМФА. Досліджена антибактеріальна активність 6-R-3-ніtro(тіоціанато)-4-феніл 1,2-дигідрохінолін-2-онів ( $R = Br, Cl, NO_2$ ) на штамах сaproфітних і умовно-патогенних бактерій [6].

В продовження цієї роботи для подальших біологічних досліджень отримані нові 1,2-дигідрохіноліони-2 (**2 а-в**) з електроноакцепторними і електронодонорними замісниками у положенні 6 молекули хіноліну. Як зручні вихідні для отримання хінолінів використовувались 2-амінобензофенони, які самі виявляють широкий спектр біологічної активності [7, 8]. Згідно з [8] були отримані 5-R-2-хлороацетиламінобензофенони (**1 а-в**) з виходами 70–90%.

Реакція циклізації проходить через стадію утворення продуктів нуклеофільного заміщення типу А, що дозволяє розглядати це перетворення як модифікацію реакції Фрідлендера.

Наявність електронодонорного метильного замісника у 5 положенні вихідного бензофенону (**1а**) суттєво не вплинула на реакцію гетероциклізації – взаємодія вихідних тривала, як і у випадку сполук з  $R = O-CF_3$  (**2б**) і  $S-CF_3$  (**2в**), близько 24 годин при кімнатній температурі.

Синтезовані сполуки (**2 а-в**) – безбарвні кристалічні речовини, помірно розчинні у полярних протонних і аprotонних розчинниках.



$\text{R} = \text{CH}_3$  (**1a**, **2a**),  $\text{O---CF}_3$  (**1b**, **2b**),  $\text{S---CF}_3$  (**1b**, **2b**);

Структура синтезованих сполук підтверджена ІЧ спектроскопією, мас-спектрометрією і даними спектроскопії  $^1\text{H}$  ЯМР.

За даними мас-спектрів для сполук (**2 a-v**) пік молекулярних іонів є базовим.

Основні первинні процеси фрагментації цих сполук пов'язані з розпадом замісника у положенні 3 молекули хіноліну.

У ІЧ спектрах синтезованих сполук у інтервалі  $1600\text{--}1620\text{ cm}^{-1}$  присутні смуги поглинання валентних коливань зв'язків  $\text{C}=\text{C}$  і  $\text{C}=\text{N}$  ароматичних ядер і групи  $\text{NO}_2$  при  $1370\text{--}1380\text{ cm}^{-1}$  і  $1530\text{--}1550\text{ cm}^{-1}$ , відповідно. Широка смуга в інтервалі  $3200\text{--}3550\text{ cm}^{-1}$  характеризує валентні коливання асоційованих  $\text{NH}$ -груп.

Наявність атома сульфуру у заміснику 6-нітро-6-трифторметил-сульфаніл-4-феніл-1,2-дигідрохінолін-2-ону (**2b**,  $\text{R} = \text{S---CF}_3$ ) змінює характер спектру ПМР молекули 1,2-дигідрохінолін-2-ону. Сигнал ароматичного протону при атомі C5 хінолінового циклу зміщується у область більш слабкого поля ( $\delta = 7.88$  м.ч.) у порівнянні з сигналом такого ж протону у сполуки (**2a**,  $\text{R} = \text{CH}_3$ ) і (**2b**,  $\text{R} = \text{O---CF}_3$ ):  $\delta = 6.89$  м.ч. і  $\delta = 6.96$  відповідно. Поява атома S приводить до зміни електронної густини структури ароматичного кільця, що обумовлює можливість спін-спінової взаємодії між протоном при атомі C5 і протонами при атомах C7 і C8 хінолінового циклу. Це проявляється у спектрі ПМР сполуки (**2b**) у вигляді пари дублетів з константами  $J=1.44$  Гц і  $J=8.9$  Гц між дублетами. Сигнал протону C5 у сполуки (**2a**) – розширений синглет з інтенсивністю 1Н при  $\delta = 6.96$  м.ч.

### Експериментальна частина

ІЧ спектри синтезованих сполук зареєстровані на приладі Specord M-80 в таблетках KBr. Mac-спектри записані на мас-спектрометрі MX-1321 з використанням системи прямого введення зразка з енергією іонізуючого випромінення 70 еВ. Спектри  $^1\text{H}$  ЯМР зареєстровані на приладі Varian-VXR-300 (300 МГц) в розчинах  $\text{DMSO-d}_6$  з ТМС як внутрішній стандарт. Контроль за перебігом реакцій та індивідуальністю синтезованих сполук здійснювали методом тонкошарової хроматографії на пластинах Silufol UV-254 (елюент етилацетат – гексан, 1:3).

2-Хлороацетиламінобензофенони (**1 a-v**) синтезовані за методикою [5].

**3-Нітро-6-метил-4-феніл-1,2-дигідрохінолін-2-он (2а), 3-нітро-6-три-фторметокси-4-феніл-1,2-дигідрохінолін-2-он (2б), 3-нітро-6-трифторо-метилсульфаніл-4-феніл-1,2-дигідрохінолін-2-он (2в). Загальна методика.**

До розчину відповідного 2-хлораацетиламінобензофенону (**1 а-в**) (0.01 моль) в 50 см<sup>3</sup> ДМСО (ДМФА) додавали (0.02 моль) натрій нітрату, (0.02 моль) сечовини, (0.02 моль) пірокатехіну і перемішували суміш до повного розчинення компонентів. Реакційну суміш залишали на 24 г при кімнатній температурі, потім випарювали розчинник під зниженням тиску або реакційну суміш виливали у 600 см<sup>3</sup> води. Утворений твердий залишок фільтрували, промивали водою, сушили на повітрі і кристалізували з етилового (ізопропілового) спирту.

**2а.** Вихід 28 %; M.W. 280; C<sub>16</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; T<sub>пл.</sub> = 318 – 320 °C (етанол).

Мас-спектр, m/z: (M<sup>+</sup>) 280. Спектр ЯМР <sup>1</sup>H, δ, м.ч.: 12.59 с (1H, NH), 7.35–7.57 м, (4H, аром.), 7.32–7.47 м (3H, аром.), 6.89 розш. с (1H, аром.), 2.26 с (3H, CH<sub>3</sub>).

ІЧ спектр, ν, см<sup>-1</sup>: 1370, 1550, 1610, 1655, 2960, 3200–3500.

**2б.** Вихід 28 %, M.W. 350; C<sub>16</sub>H<sub>9</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>F<sub>3</sub>; T<sub>пл.</sub> = 255–257°C, (етанол).

Мас-спектр, m/z: (M<sup>+</sup>) 350. Спектр ЯМР <sup>1</sup>H, δ, м.ч.: 13.05 с (1H, NH), 7.58–7.60 м (5H, аром.), 7.38 м (2H, аром.), 6.96 розш. с (1H, аром.).

ІЧ спектр, ν, см<sup>-1</sup>: 1380, 1530, 1610, 1655, 3200–3550.

**2в.** Вихід 29 %, M.W. 366; C<sub>16</sub>H<sub>9</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>SF<sub>3</sub>; T<sub>пл.</sub> = 246 – 248 °C, (ізопропанол).

Мас-спектр, m/z: (M<sup>+</sup>) 366. Спектр ЯМР <sup>1</sup>H, δ, м.ч.: 13.15 с (1H, NH), 7.88 дд (1H, аром.), 7.59–7.61 м (4H, аром.), 7.39 м (3H, аром.), J=1,04 Гц, J=8,9 Гц. ІЧ спектр, ν, см<sup>-1</sup>: 1375, 1530, 1610, 1655, 3200–3550.

## Література

1. *Synthesis of 5-Fluoro Analogues of Norfloxacin and Ciprofloxacin* / D. B. Moran, C. B. Ziegler, T. S. Dunne, N. A. Kuck, Y. Lin // *J. Med. Chem.* – 1989. – Vol. 32, N 6. – P. 1313–1318.
2. 8-Methyl-7-substituted-1,6-naphthyridine-3-carboxylic Acids as New 6-Desfluoroquinolone Antibacterials / S. Sabatini, V. Cecchetti, O. Tabarrini, A. Fravolini // *J. Heterocycl. Chem.* – 1999. – Vol. 36, N 4. – P. 953–957.
3. *Верещинова В. П., Таракенко О. А., Грищенко Л. Н. Фторхінолони* // Провизор. – 2002. – № 19. – С. 36–40.
4. Синтез 2,3,4,6-тетразаміщених хінолінов на основе 5-R-2-хлораацетиламінобензофенононів / Е. І. Іванов, Л. В. Грищук, Р. Ю. Іванова, А. В. Мазепа // Журн. орг. хим. – 1999. – Т. 35, № 12, – С. 1877–1881.
5. *Про синтез 3-заміщених 1,2-дигідрохінолінів* / Л. В. Грищук, С. А. Андронаті, Е. І. Іванов, В. є. Кузьмін, Г. М. Турянська // Вісник Одеського національного університету. – 2003. – Т. 8, № 7. – С. 109–117.
6. *Синтез і антибактеріальна активність нових похідних 1,2-дигідрохінолін-2-ону* / Л. В. Грищук, [Е. І. Іванов], Г. М. Турянська, Н. О. Єлинська, І. В. Фабіянська // Журн. орган. і фарм. хімії. – 2007. – (направлена до друку).
7. *Данилин В. В. Синтез, строение и некоторые свойства производных 1,5-ベンздиазоцин-2-она: Дис...* канд. Хим. наук: 02.00.03. – Одеса, 1982. – 125 с.
8. *Quinazolines and 1,4-Benzodiazepines. V. o-Aminobenzophenones* / L. H. Sternbach, R. Fryer Ian, W. Metlesics, Sach G. Stempel A. // *J. Org. Chem.* – 1962. – Vol. 27, N 11. – P. 3781–3788.

**Л. В. Грищук<sup>1,2</sup>, Э. И. Иванов, А. М. Турянская<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Физико-химический институт им. А. В. Богатского НАН Украины,  
отдел кализа,  
Люстдорфская дорога, 86, Одесса, 65080, Украина.

<sup>2</sup>Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова,  
кафедра фармацевтической химии,  
ул. Дворянская, 2, Одесса, 65026, Украина.

## **СИНТЕЗ НОВЫХ 6-R-1,2-ДИГИДРОХИНОЛИН-2-ОНОВ**

### **Резюме**

Реакция гетероциклизации 2-хлорацетиламинобензофенонов, как с электроноакцепторными так и электронодонорными заместителями в 5 положении, с нитритом натрия в среде ДМФА либо ДМСО приводит к новым 6-замещенным 1,2-дигидрохинолин-2-онам, потенциальным биологически активным соединениям.

**Ключевые слова:** хлорацетиламинобензофенон, 1,2-дигидрохинолин-2-он, метилхинолин-2-он, трифторметоксихинолин-2-он, 6-трифторметил-сульфанилхинолин-2-он

**L. V. Grishchuk<sup>1,2</sup>, E. I. Ivanov, A. M. Turyanskaya<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>A. V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine,  
Department of catalysis,  
86, Lustdorfskaya doroga, Odessa, 65080, Ukraine.

<sup>2</sup>I. I. Mechnikov Odessa National University,  
Department of the pharmaceutical chemistry,  
2, str. Dvoryanskaya, Odessa, 65026, Ukraine.

## **SYNTHESIS OF THE NEW 6-R-1,2-DIHYDROQUINOLINE-2-ONE**

### **Summary**

Heterocyclization reaction of 2-chloroacetylaminobenzophenones, either with electron-donating, or electron-withdrawn substituents in the 5 position, with sodium nitrite in DMF or DMSO medium brings to new 6-substituted 1,2-dihydroquinoline-2-ones, the potential biologically active compounds.

**Keywords:** chloroacetylaminobenzophenone, 1,2-dihydroquinoline-2-one, methylquinoline-2-one, trifluoromethoxyquinoline-2-one, trifluoromethyl-sulfanylquinoline-2-one

Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF Splitter.

A watermark is added at the end of each output PDF file.

To remove the watermark, you need to purchase the software from

<http://www.anypdftools.com/buy/buy-pdf-splitter.html>